

N^o. 53

Sur la castration

par en. marffchal
en^e. en chir. en chef de l'hôpital
Bourgeois à Strasbourg



ARC 18 d 4 n^o 53 MARCHAL

1843

1843

1843

2



Memoire

Sur la Castration

De toutes les maladies qui affectent le Testicule, il n'en est guère qui exigent l'amputation, que le Sarcocèle. Sa dégénérescence en Ichirre et en Cancer ne peut qu'ajouter à la nécessité de cette opération. Les différentes maladies avec lesquelles le Sarcocèle peut être compliqué sont décrites presque dans tous les auteurs qui ont parlé des hernies. Il me suffira d'établir, d'après les divers Systèmes d'opérations proposés pour la cure de cette maladie, une doctrine dont les résultats, confirmés par l'observation, serviront de base.

La castration (ainsi nomme-t-on cette opération) a subit le sort de toutes les autres, elle s'est perfectionnée à mesure



qu'il s'y est trouvé des hommes qui ont travaillé à étendre les progrès de l'Art. Ils sont entrés dans des discussions intéressantes sur le manuel de cette opération; bien persuadés qu'ils étoient, que la source des accidens primitifs et secondaires en dépendoient réellement. Cette persuasion n'est point illusoire; mais il a pu se faire qu'on ait passé trop superficiellement sur le point essentiel qui fait encore aujourd'hui un mystère dont la découverte seroit un nouvel avantage pour l'humanité; ce sera l'objet de mes recherches.

Ce n'est pas sans raison qu'on a spécialement fixé son attention sur la ligature du cordon spermatique; il est sur, que le succès le plus complet, et le plus prompt dépend des précautions que l'on prend dans l'opération même. Les praticiens le plus instruits ont vu la nécessité de pénétrer dans les fausses qui déterminoient les dangers attachés à la ligature. Ceux qui ont été témoins de ces dangers dans leur pratique, comme ceux qui n'ont jamais fait cette opération ont proposé leurs moyens. On a été d'abord d'avis de séparer le filet nerveux qui accompagne le cordon, avant d'en faire la ligature. le système actuel a été

préconisé indépendamment même de la ligature. On a prétendu ensuite qu'il convenoit mieux de Soustraire à cette ligature le canal déférent. Les uns ont pensé que l'origine des accidens venoit de la ligature pratiquée trop haut, et les autres ont voulu que ce soit paraqu'elle étoit placée trop bas. mais comme ni l'une ni l'autre de ces tentatives, n'ont jamais contribué qu'imparfaitement à remplir l'objet qu'on s'étoit proposé, on a cru qu'il falloit Séparer entièrement le Testicule avant que de faire la Section du cordon; un Sentiment contraire a prévalu chez quelqu'une, ils ont préféré faire la ligature et la Section du cordon, avant que de Séparer le Testicule. l'insuccès de ces expériences en a déterminé d'autres à abandonner à la nature le Soins de détacher le Testicule après la ligature, d'autres, enfin, ont substitué à cette ligature, la compression du cordon replié Sur le pubis Sec.

Tant des Sentimens différens, et pour la plus part tous opposés m'ont fait désirer de les comparer avant que de proposer mes réflexions. deux accidens également redoutables, l'hémorrhagie et la douleur; doivent être l'objet de l'attention de l'opérateur. Si les préceptes que



je me propose d'établir n'ont pas le mérite de la nouveauté,
ils auront au moins celui d'être justifiés par l'observation.

Celse, est le premier à ce qu'il m'a paru, qui a
conseillé la Section du fillet nerveux qui rampe autour
du cordon spermatique, afin de prévenir les accidents
que sa compression occasionneroit, s'il étoit comprimé
dans la ligature qui ferme les vaisseaux sanguins. 1).
malgré l'insuffisance de cette Section, elle ne seroit point
à rejeter si elle étoit toujours praticable. la difficulté
de rencontrer ce nerf, de le saisir, et de le séparer, rendroit
incontestablement l'opération longue et pénible, sans ajouter
beaucoup à sa perfection. D'ailleurs la compression du
nerf n'est pas le seul moteur de la douleur; les vaisseaux
artériels et veineux ny concourent pas moins. tant d'obstacles
presqu'inaccessibles ont fait oublier les préceptes de Celse,
et peut-être seroit-il difficile de prouver s'ils ont jamais
été mis en pratique.

Paul d'Argentine 2) n'en parle point. il conseille
tout simplement de séparer les vaisseaux spermatiques

1) nervusque ex quo testiculus dependet praecidendus. Cap. 22. Lib. 7.

2) Cap. 63. Lib. 6.

du frumaster avant que de les lier, mais il est très observé Sur l'attention qu'on doit avoir de retrancher avec le testicule toutes les parties endurcies.

Si Celse a dirigé ses vues du côté de la douleur, Paul d'ægine n'a considéré que l'hémorrhagie, et pour l'assurer contre elle, il est d'avis qu'on passe l'équille entre le scrotum, et qu'on en tie chaque moitié séparément. malgré la possibilité qu'il y a d'ouvrir les vaisseaux sanguins par ce procédé, l'inconvénient de voir la ligature ne se détacher qu'avec peine et après un long temps, n'est pas sans considération.

La pratique de Paul d'ægine n'a pas moins un avantage réel qui est échappé à Fabr. d'aquapendente 3) qui marque par tout le plus grand attachement à la Doctrine. il n'est point indifférent de séparer les vaisseaux spermaticques du frumaster avant que de les lier, et dans peu nous expliquerons pourquoi. F. d'aquapendente n'y a aucun égard, il les soulève avec des pinces pour passer sa ligature, et après avoir retranché le testicule, il les cauterise. c'est ainsi qu'il dit avoir guéri un malade dans vingt jours, et qui seroit mort dans quatre 3) de hernia Carnosa. pag. 275.



S'il n'eût pas appliqué un bouton de feu sur l'extrémité du sordou. On ne sait point les motifs qui déterminent l'*Aquapendente* à cautériser le sordou après l'avoir lié, si ce n'est afin de se fortifier contre l'hémorrhagie, ou, une ligature bien faite suffit à tout, et la cautérisation devient superflue. Si c'est pour enlever la sensibilité du nerf et empêcher l'extension de la douleur, il est permis de douter de l'efficacité du cautère, à qui il paroit cependant avoir la plus grande confiance, puisqu'il croit que son malade seroit mort dans quatre jours, s'il ne l'eût pas cautérisé.

La méthode de Paul d'Aegine est plus recherchée et approche d'avantage de la perfection que celle de Fabr. l'*aquapendente*. 4) L'application du feu est également recommandée par de Vigo 5) dans la cure du Sarcocèle, mais

4) N^o. Je ne crois pas devoir omettre en passant ce qu'il dit de la Cure de l'Hydro-Sarcocèle. Cette Cure consiste à pratiquer une petite ouverture à la partie Supérieure de la Tumeur et d'y porter une tige de charpie chargée de digestif qu'on ne renouvellera que de loin en loin, et de laisser dans le fond de la plaie une bonne partie du pus, afin qu'il corrode et détruise les parties vicieuses; et c'est ainsi qu'il guérit, et ita Sanat. Cette pratique trouveroit difficilement des partisans aujourd'hui.

5) Cap. 6. lib. 2. pag. 211. et 212.

ce n'est que dans le cas, où le Testicule seroit affecté de gangrène, la ligature faite et le Testicule amputé, il cauteriseroit l'extrémité du Sordou, pour empêcher, peut-être, comme dit *Laré*, que les Vapeurs putrides ne se portent au fœtus ou au fœveau.

Si on en feroit *Heister*, cette pratique étoit aussi celle de *Scultet*. ⁶⁾ mais on ne trouve nulle part que ce Chirurgien ait proposé le système actuel dans la castration. rien n'est plus précis que ce qu'il dit du manuel de l'opération. l'incision faite, selon les règles générales, qui consistent à faire pincer les teguments d'un côté, tandis que l'opérateur les serre de l'autre, il ouvre la tumeur dans toute son étendue. la tunique vaginale étant divisée, il passe une aiguille enfilée d'un gros fil fin, à l'extrémité duquel il fait un arrêt. cette ligature est ensuite fixée et abajettée par un double nœud bien assuré. *Scultet* borne là, la description de l'opération; on voit que, si elle n'a rien de recherché, elle n'a rien non plus de contraire à la saine doctrine.

Ambroise Paré ⁷⁾ est encore plus méthodique. il sépare d'abord la tumeur du Scrotum, et après avoir détruit les adhérences du Sordou, attention qui est échappée.

⁶⁾ Tab. 41. pag. 294. et 95.

⁷⁾ liv. 8. Chap. 28. pag. 202.



à Scultet, il passe une aiguille enfilée au dessus du Testicule, et la ligature faite, il l'ampute. Il recommande avec soin, qu'on laisse les bouts de la ficelle avec laquelle on auroit fait la ligature, assez long hors de la playe.

Les précautions décrites par Paré dans l'opération, sont fidèlement observées par Vigerus 8) excepté qu'il insiste comme Paul d'Aigine sur la nécessité d'emporter avec le Pistonné tout ce qui pourroit y avoir de dur dans les environs du Testicule; non seulement dans la crainte de voir récidiver la maladie, mais encore dans celle de voir guérir la maladie. afin de se mettre à l'abri de l'hémorrhagie, il pense qu'il est à propos de faire deux ligatures au fordon. la première au dessus et la seconde un peu plus bas, et ce n'est que d'après ce double lien, qu'il retranche le Testicule. Thevenin 9) qui écrivoit dans le même temps que Vigerus, n'admet également la ligature qu'après la séparation totale du Testicule et du fordon, d'avec les parties auxquelles ils adhèrent. Il est vrai qu'il ne désigne pas précisément le lieu où cette ligature doit être posée; il dit seulement

8) lib. 1. Cap. 32. de Sarcocèle.

9) traité d'opérations de Chirurgie pag 62. chap. 43.

9.
qu'elle sera placée au dessus de la tumeur et qu'on coupera
ce qu'il y aura de superflu, un demi doigt au dessous. un
peu plus d'exactitude à Thevenin auroit pu hâter
les progrès de l'art; on auroit eu d'autant plus de confiance
à ses préceptes qu'il jouissoit de la réputation de grand opérateur.

Saviard 10) qui, comme Thevenin, exerçoit la
Chirurgie à Paris avec distinction, est le premier qui ait
parlé de détacher la gaine du cordon des parties auxquelles
elle adhéroit. „ l'incision faite sur l'étendue de la tumeur,
„ et le testicule decouvert aussi bien que le progrès de la —
„ gaine qui enveloppe le cordon des vaisseaux Spermatiques,
„ dit, ce grand Chirurgien, je séparai totalement le Testicule
„ et la gaine du dartos, puis le faisant tenir suspendu
„ par un serviteur, je liai avec un fil cire quatre fois
„ redoublé la gaine et le cordon des vaisseaux, le plus près
„ des anneaux des muscles qu'il me fut possible, sans —
„ passer l'aiguille au travers du cordon, de crainte d'occasionner
„ l'hémorrhagie par la piqûre de quelques vaisseaux sanguins,
„ après cela je séparai le Testicule et les vaisseaux à un
„ travers de doigt de la ligature, „

Si Saviard ne s'explique par sur les motifs qui le

10) Obs. chir. 125. pag. 67. et suivantes.



déterminent à suivre le progrès de la gaine qui enveloppe le
 cordon, il n'est pas moins presumable qu'il présageroit les accidens
 qui pourroient résulter de l'adhérence du cordon; particularité
 que nous nous proposons d'examiner dans peu. Il rejette
 avec prudence la ligature faite en traversant le cordon,
 comme le propose **Paul d'Aegine**, et ses craintes sont
 certainement fondées. Il seroit à souhaiter qu'il ait pu
 suivre son malade, il auroit eu la satisfaction de voir que
 la grosseur douloureuse à l'endroit de l'anneau, grosseur dont
 il paroît en peine, se seroit dissipée sous le dégorge-
 ment suppuratoire. Cette tumescence est constante toutes les fois qu'on
 a prolongé l'incision jusqu'à l'anneau, dans la cure de l'hydrocèle,
 comme dans celle de la castration. Cette tumeur d'ailleurs n'est
 jamais conséquente; l'expérience apprend qu'elle s'affaiblit
 et se détruit d'elle-même, à mesure que la cicatrice fait
 des progrès.

La ligature près de l'anneau est un fait de morale que
 qu'on ait approuvé **Garengot**. ii) il y a plus; —
 il propose de couper le pilius supérieur de l'anneau de
 l'oblique externe, afin de porter la ligature à l'endroit
 même de l'anneau, ou un peu au dessus. Il expose ensuite

ii) Opérations de Chirurg. T. 2. de la Castration. pag. 323. et suivantes.

Son procédé opératoire avec toute la précision possible, et les réflexions qu'il fait en le décrivant ont enrichies l'art de connoissances très utiles.

Jarengéot commençoit par ouvrir tout le Scrotum; et le scidon est volumineux, il veut qu'on l'examine pour s'assurer s'il ne renferme point quelques parties échappées hors du bas-ventre. Cet acte de prudence tout louable qu'il est, est suivi d'un autre non moins digne de la sagacité de ce grand maître. Quand l'épiploon est sorti, il observe qu'avant d'en faire la ligature, il convient aussi de s'assurer s'il ne cache pas quelques portions d'intestin. Cette observation n'est pas vaine, et pour preuve de la possibilité qu'il y a de se tromper, il rapporte un fait arrivé à M. Thibaut, qui l'aurait infailliblement soupçonné sans cette précaution.

Lecteur pourroit-on croire, que c'est uniquement par égard pour cette complication, que Jarengéot conseille de couper le pilier supérieur de l'oblique externe; mais non. Son procédé est le même dans tous les cas, où l'amputation du testicule peut avoir lieu, qu'il soit gangrené ou écrasé, qu'il y ait des excroissances, ou non, et il ajoute „ quand même il n'y auroit ni descente, ni abcès, ni hydropisie „ dans la tunique vaginale „.

Garengeot qui se doute bien que sa pratique paroitra peut-être un peu extraordinaire, s'appuie de l'autorité de feu M^r. Arnaud qui assure qu'elle a cette préférence sur les autres, que le pilier de l'oblique externe étant coupé, l'anneau ne comprime plus le fordon, et que suite de cette compression, il n'est plus exposé à s'enflammer; accident; dit M^r. Arnaud, qui fait périr la moitié des malades par les symptômes que cette compression occasionne.

Les savantes précautions n'étoient qu'une partie de celles que Garengeot prenoit pour le succès de cette opération; il cherchoit encore à s'assurer contre l'hémorrhagie par des ligatures qu'on pourroit peut-être lui reprocher d'avoir trop multipliées, quoique bien concertées qu'elles étoient. — Il plaçoit d'abord sur le fordon une petite compresse — ~~longue et étroite~~ qu'il serroit très fortement quoique par un noeud simple. il faisoit ensuite un second tour ajusté — par un double noeud, soutenu par un autre noeud simple. Cette ligature étoit placée avant la section du fordon, et après avoir totalement séparé le Sac et le Testicule. Il faisoit l'opération en deux temps; Il coupoit premièrement le Sac un travers de doigt au dessous de cette ligature, et

ce n'étoit qu'après, qu'il retranchoit le fordon spermatique quatre travers de doigt plus bas; afin d'avoir la liberté de faire une seconde ligature aussi forte que la précédente. en cas que la première vint à se relâcher.

Le profond Chirurgien n'a pas réuni tous les Suffragés, on l'a accusé d'avoir sans raison, multiplié les ressources de l'art. mais si on le juge avec équité, on verra que si on est devenu plus hardi aujourd'hui, ce n'est qu'à l'expérience qu'on le doit. Il seroit injuste quoique disent *Hœnel et Ravaton*, de lui vouloir mal d'avoir cherché à se mettre à l'abri des événements qu'on redoute le plus dans les opérations, les hémorrhagies. *Garengeot* fait ensuite de nouvelles réflexions sur la nature du fordon spermatique. „ Dans le cas où ce fordon et ses membranes „ auroient beaucoup augmenté de Volume et que les vaisseaux „ seroient variqueux (comme cela se rencontre en effet) une „ seule ligature autour du fordon pourroit bien ne pas suffire; „ la suppuration venant à diminuer son volume, la ligature „ se relâcheroit inévitablement, et l'artère pourroit jeter du „ sang, ce qui rendroit la cure plus difficile. „ C'est dans cette défiance qu'il conseille de passer un petit ruban de trois ou quatre brins de fil ciré dans l'ouverture d'une éguille et

d'en percevoir le fordon à son extrémité, et de tirer ensuite le ruban sur deux petites compreses.

La ligature du fordon près de l'anneau a trouvé des contradicteurs. *Koenel* 12. a opposé que la Suppuration du fordon devoit gagner les parties internes et pourroit déterminer des absces considérables, qui joint à une fièvre continue faisoient perir les malades. La crainte de *Koenel* n'est pas tellement fondée qu'on ne puisse la combattre. Si l'extrémité du fordon suppure, cette Suppuration doit être bien légère. il n'y aura que la portion conservée au dessous de la ligature qui pourra fournir, ce qui est au dessus ne suppure point ou bien peu, à moins que par des mouvements indiscrets on ne détache la ligature avant le terme de la coagulation. on peut, à quelques égards pris, comparer la compression de cette fistule à celle du fordon ombilical chez les nouveaux nés; il est bien rare, d'ailleurs, que la ligature tombe avant la fistule parfaite, et de quelle manière que ce soit, le pus n'est jamais assez abondant pour produire les dangers

12. Quo facto muscoli simul suppurare, et abscessus ingentes formare solent, qui cum febris nunquam desit, aegrum ad tumulum usque comitantur. Hec. Dissertatio inauguralis de morbis Peroti Aust. Argentorat. anno 1723. pag. 3. a 32.

effets par les quels Koenel voudroit nous intimider. mais
 allons plus loin. Si la Section du pilius Supérieur de
 l'anneau est un second Sujet de crainte pour Koenel
 quant à l'épanchement de la Suppuration dans le bas ventre;
 pourquoi ne redoute-t-on pas cet épanchement dans l'opération
 de la hernie, Opération dans laquelle on retranche quelque
 fois une portion d'épiploon Exc. qu'on réduit ensuite dans
 la cavité du bas ventre. Si on ne coupe pas toujours
 le pilius dans l'opération du bubonoile au moins
 incise-t-on l'anneau. Or, cette incision ainsi que la
 plaie faite à l'épiploon devant nécessairement subir
 quelques alternatives avant d'être cicatrisée, ils n'échappent
 sûrement point à la Suppuration. Cette Suppuration
 n'a cependant jamais inspiré les mêmes craintes aux
 praticiens, qu'à Koenel. Si l'accident attaché à la
 castration ont certainement une autre cause qui est échappée
 aux lumières de ce Médecin.* Revenons à Garengot
 et jugeons de sa grande érudition par ses préceptes.

En réunissant tous les points de sa doctrine, on voit.

* Un autre inconvénient nous feroit désapprouver la ligature trop près de
 l'anneau, ce seroit la crainte que l'engorgement du cordon près de la ligature
 ne s'opposât à sa rétraction, et qu'en conséquence il ne fût une adhérence
 dans l'endroit même où l'on auroit le projet de l'éviter.



qu'ils tendent d'abord à dégager le cordon spermatique avec
soin, de toutes les parties qui lui adhèrent; afin que, n'étant
point comprimé ni attaché nulle part, il puisse se retirer
sans obstacle. tout connoître à ce projet; la destruction des
adhérences, l'incision du plicia supérieur de l'anneau,
et la ligature du cordon qui ne se fait qu'ensuite de
ces précautions. Si le cordon s'enflamme, il s'enflamme
peu; et s'il adhère avec l'anneau, ce n'est jamais qu'avec
son fond. Si on compare la pratique de **Garengot**,
à celle de **Fabr. d'Aquapendente**, je ne suis
point en peine de la préférence, qu'un chirurgien éclairé
donnera à une de ces méthodes plutôt qu'à l'autre.

Les motifs par lesquels **Le Dran** ¹³ suspecte la
ligature du cordon prise de l'anneau sont différents de
ceux de **Moënel**. il dit, que, si on lui demande,
pourquoi il ne fait pas cette ligature au dessous de
l'anneau comme les auteurs le prescrivent, il répondra
que si la ligature s'échappe, on ne peut plus lier l'artère
qui se retire au dessus de l'anneau, où elle peut donner
du sang dans le tissu cellulaire du Testicule, et faire
périr le malade comme on la vû arriver. **Le Dran**

¹³ Opérat. de Chirurg. p. 192. et suivantes.

à sans doute raison, mais comme il est aisé de s'assurer
contre l'événement qu'il paroît craindre, ce motif seroit
tout au plus suffisant. Les vûes de ce célèbre Chirurgien
se portent sur un autre objet digne de toute notre attention.
il regarde non seulement comme inutile mais comme
dangereux de lier tout le cordon; la ligature n'ayant
d'autre fin que celle de prévenir l'hémorrhagie, il sépare
l'artère du cordon, la lie et abandonne le spermastère, le
sacral déférent et le nerf, dans l'intention d'éviter les
mouvements convulsifs qui arrivent en conséquence de cette
ligature. mais les mouvements convulsifs ne dépenderoient-
ils pas aussi en partie de la ligature de l'artère? —
C'est ce qui seroit intéressant de savoir, et Ledran ne
nous dit pas si par ce procédé on est à l'abri de ce
accident. on presume de la difficulté de détacher l'artère
du cordon, et d'en faire assez heureusement la ligature
pour n'y pas compromettre le nerf. Des observations
répétées avec impartialité pourroient peut être justifier
la pratique de ce Chirurgien qui fait aujourd'hui
l'honneur du Siècle. Quand même les choses arriveroient
autrement, on ne peut s'empêcher de rendre justice à son
exactitude, il est le premier qui ait parlé de la rétraction



du fordon en parlant de celle de l'artère, et c'est cette rétraction pour laquelle on n'a pas toujours eu tous les égards qu'elle mérite, qui est incontestablement la Source des accidents, comme on se propose de le faire voir.

Meister, qui a simplifié tout la Chirurgie sembloit annoncer quelques étincelles de lumière sur la Théorie relative à la pratique de cette opération, mais loin d'entrer dans ces détails importants qu'un long exercice dans la Chirurgie auroit dû lui suggérer, il est au contraire très succinct. on se trouve même disposé à croire en le lisant, qu'il s'est borné à la doctrine de ceux qui ont le moins contribué à la perfection de ce genre d'opération. on pourroit même dire que d'entre toutes les méthodes proposées, il a préféré la moins satisfaisante, et la plus susceptible d'inconvénient. il a adopté avec quelque apparence le procédé d'aquapendente; sans avoir pris la peine de le perfectionner. il se restreint comme lui, à dire qu'il faut lier le fordon spermatique avant que de le dégager ainsi que le testicule, puis ensuite faire la ligature à un travers de doigt de l'anneau en ne retranchant le testicule qu'à un pouce au dessous de cette ligature. l'hémorrhagie est un accident duquel il ne parle qu'en passant. „ Quelque Chirurgien, dit Meister ont pensé qu'il étoit

à propos de faire deux ligatures l'une sur l'autre. D'autres
 ont imaginé qu'après avoir séparé le testicule du Scrotum
 et lié les vaisseaux spermaticques sans les couper, on attendit
 pendant quelques jours que le testicule se flétrit pour le
 retrancher. Si le testicule ne se flétrit pas sous cette
 première ligature, c'est une preuve qu'elle n'aura pas été
 suffisamment serrée et alors il faudra en faire une seconde.
 Il est vrai qu'Heister ne paroit pas avoir plus de
 confiance qu'il en faut à cette inutile et ridicule précaution.
 en effet, toutes les fois qu'on aura fait cette ligature avec
 intelligence, on aura peu d'inquiétude sur l'hémorrhagie,
 sur tout si on a eu l'attention de laisser de la marge, —
 c'est-à-dire, de ne retrancher le cordon spermaticque qu'à
 un pouce environ de cette ligature, afin de pouvoir en placer
 une seconde, au besoin.

On avoide pour un instant que cette expectative soit
 une assurance contre la crainte de l'hémorrhagie; mais
 il s'agit de savoir actuellement si elle n'excite pas des
 douleurs auxquelles il seroit possible de soustraire le
 malade en amputant d'abord le testicule. Il est de fait
 que le testicule ne se flétrit jamais si promptement qu'il
 ne se tuméfie d'avantage et ne s'enflamme avant que de se

dessécher. Les tumeurs successives d'engorgement et d'inflammation
 ne sont jamais indolentes quelque serree qu'on suppose
 la ligature. Les premiers principes de l'art de guérir
 sont d'écarter la douleur ou de l'appaiser si elle existe ;
 par conséquent le procédé contraire à l'amputation faite
 sur le champ est évidemment plus propre à la faire naître,
 qu'à l'éloigner. Bertrandi ¹⁴⁾ parle de ce système
 d'opération, mais on ne sait s'il l'approuve ou s'il le
 rejete. Il prend une précaution bien plus sage pour
 prévenir le retour du sang, si le cordon venoit à se flétrir.
 Cette précaution consiste à laisser un fil étendu sous le
 cordon, afin qu'au cas de besoin on puisse faire une
 autre ligature. Bertrandi qui convient d'après sa
 propre expérience que le testicule étant coupé, le cordon
 a coutume de se retirer peu ou beaucoup vers l'anneau,
 propose d'en faire la ligature le plus bas possible.
 il se trouve aussi parfaitement d'accord avec Garengeot.
 Sur la dilatation de l'anneau, ou plutôt sur son incision,
 mais il n'est qu'au cas que le cordon viendroit à se gonfler
 après l'opération. Garengeot qui propose de l'inciser
 dans l'opération même, est-il condamnable ? n'est-il pas

14) Traité d'opérations de Chirurg. pag. 209.

préférable de terminer une opération tandis qu'on s'en occupe, que d'y revenir après coup; ajoutons à cela et demandons, s'il est toujours possible d'insérer l'anneau lorsque le fordon tuméfié, le remplit, et le ferme. Il arrive quelque fois que l'ouverture en est si exactement bouchée, que pour parvenir à sa insertion, on est obligé, de tirer un peu le fordon à soi, afin de pouvoir y porter un Bistouri moulu. Cette rétraction du fordon du dedans au dehors toute possible qu'on l'imagine, peut-elle toujours être tentée sans inconvénient, quoiqu'avec précaution? je ne le crois pas.

L'opération de la castration est décrite dans la traduction des essais et observations de Médecine d'Edimbourg par c. Alexandre Monro ¹⁵) d'une manière assez confuse. Monro propose d'abord, de faire une longue incision sur le trajet des vaisseaux — „Spermaticques“, de les mettre à nud, et de s'emparer „ensuite de ces vaisseaux avec le pouce et l'index d'une main, de façon que les ongles de ces deux doigts se touchent; au moyen de quoi on passera par dessous „un éguille très courbe garnie d'un fil; ou bien on se

¹⁵) Tom. 5. pag. 415. et suivantes.




„Servira de l'équille munie d'un manche et d'un oeil vers la
 „pointe“. Cette opération aussi compliquée dans le récit
 que dans le fait, laisse une chose à désirer qui n'est
 pas la moins intéressante. Monro ne désigne point
 le lieu où on doit placer la ligature. Il se suffit en
 disant qu'elle sera faite aussi fortement qu'on pourra, —
 avec un fil cire fort et applati. Il rejette les petites
 compresses conseillées par *Claudio*, et approuvées
 par un grand nombre de praticiens, et enfin il est d'avis
 qu'on retranche les restes du fil qu'on se fait un devoir
 de conserver afin de réserver la ligature. Si le sac venoit
 à l'exiger, ainsi que *Laré* le recommande. Cette
 ligature étant faite, il ouvre le Scrotum jusqu'en bas
 par le côté qui regarde la fuisse, il renverse ensuite
 la peau au dehors, et fait la ligature de l'artère du
 sac. Cela fait, il distingue le testicule et les parties
 dures, adhérentes, et s'oppose à ce qu'on sépare le
 cordon spermatique des membranes qui l'enveloppent,
 dans la fousse, où il est, qu'elles assurent les fils
 et l'empêchent de glisser, et persuade, enfin, qu'il n'y a
 aucune rétraction du cordon des vaisseaux, il regarde
 comme inutile la section de l'anneau.

D'après cet exposé, fidèlement rapporté il est permis de douter si le testicule est amputé, ou s'il est encore en place. Souvenons que, si la pratique de **Monro** a eu quelques succès, elle n'en est point inimitable pour cela. Le conseil qu'il donne de laisser subsister les adhérences autour du fordon, m'inspire en particulier la plus grande défiance; convaincu que je suis que ces adhérences sont un obstacle presque invincible à la rétraction du fordon. L'observation justifie que l'exacte séparation du fordon et du testicule de toutes les parties avec lesquelles ils ont contracté des adhérences, est le point auquel tiennent les succès les plus graves. peut-être aussi pourroit-on tirer de là, des inductions non moins intéressantes encore, de la nécessité qu'il y auroit de ne faire la ligature qu'après cette séparation totale, et après avoir même amputé le testicule? Il y a lieu de croire, que le succès des deux opérations rapportées par **Monro** a dépendu principalement du bon état du fordon, et par conséquent de la facilité qu'il a eu de se tendre; effets relatifs à la constitution, à l'âge du malade, ainsi qu'à l'origine de la maladie, à son point d'accroissement, et à son plus ou moins d'ancienneté.

Lott (b) qui vient d'écrire tout récemment n'a pas cru devoir

(b) Œuvre Chirurg. T. 2. pag. 223. et suivantes.



Saisir les préceptes de *Monro*. Il est plus méthodique que lui, mais guère plus érudit. Il discute avec fondement sur la longueur que doit comporter l'incision, afin de donner au Chirurgien la liberté et la facilité de faire ce qui est nécessaire; il détruit ensuite les connexions membraneuses qui environnent le fordon, et sépare avec le doigt et le pouce le canal déférent qu'il craint d'embrasser dans sa ligature. quoiqu'on ne sache pas, s'il porte cette ligature près de l'anneau ou beaucoup au dessous, il ne retranche pas moins le fordon un quart de pouce plus bas, conformément à l'état du fordon et du testicule; mais ce n'est ainsi que *Monro* qu'après la ligature faite, qu'il détruit les adhérences du testicule avec le scrotum, et qu'il l'ampute. *Lott* croit ce procédé préférable à celui de rompre les adhérences avant que de poser la ligature, et pour le persuader, il ajoute, qu'il est d'une plus grande conséquence que ne l'imaginent ceux qui ne l'ont pas essayé; en ce que l'opération est plus facile, plus prompte, et plus avantageuse pour le malade. quoiqu'on a déjà fait pressentir la préférence de la méthode contraire; on répondra plus en long à cette question de fait en décrivant l'opération.

Lott beaucoup plus circonspect que *Monro* sent

l'importance qu'il y a de dégager le fordon de toutes adhérences, tandis que *Monro* s'y oppose en termes capricieux, sous deux motifs qui n'ont aucune consistance apparente. S'il pense que la ligature est plus dure en embrassant les membranes avec le fordon, n'auroit-il pas été plus à propos de suppléer à l'inconvénient de cette pratique par l'usage des petites compressees conseillées par *Garengéot* et qu'il rejete sans raison, que de laisser subsister les adhérences. On ne voit pas non plus pourquoi *Pott* exclus de la ligature le canal déférent. Si c'est à la compression de ce canal qu'il impute les accidens qui suivent cette opération, on pourroit lui savoir mauvais gré de s'être lu sur des particularités qui auroient été du plus grand intérêt. *

* *N.B.* *Pott* parle avec une indécence tout à fait déplacée de la méthode de *Sedran* et de *Garengéot* qui se servoient des ciseaux pour détruire les adhérences du testicule et du cordon avec les parties voisines. Son traducteur n'auroit pas démerité, s'il avoit rendu les expressions de cet Anglois d'une manière plus honnête. *Sedran* ne se sert des ciseaux, que lorsque ses doigts ne suffisent pas. Il est assez indifférent de se servir du bistouri, ou des ciseaux dans la circonstance. la préférence du bistouri à ces derniers, dépend de l'état et de la situation des parties qu'on a le projet de retrancher, comme de l'habitude qu'on a de se servir de l'un de ces instrumens plutôt que de l'autre. Les Epithètes de

Pott rapporte quelques observations choisies sur la cure radicale du Sarcoïde, autant peut-être pour faire triompher sa méthode d'opérer, que pour faire connoître le prix de l'opération en général dans des cas où il y avoit plus

gaucheries de Cuillers qu'il applique si généreusement au manuel de *Garengot*, peuvent aller de pair avec celles de grossières et de ridicules dont il accièille la manière de faire de *Ledran*. Les Chirurgiens Anglois n'ont pas acquis le droit de déprimer les Chirurgiens François, mais eux cy, dont les mœurs sont naturellement douces, pardonnant autant par honneur que par pitié, les invectives d'une Nation qui ne se distingue que par la rudesse et la malhonnêteté. Il seroit plus facile que ne le pense *Pott*, de le ramener devant son tort. Quand *Garengot* préfère d'agrandir son incision avec des Ciseaux mousses préférablement au Bistouri, il sait sûrement que les Ciseaux entre les mains de celui qui sait les conduire, abrège l'opération. cela se conçoit d'autant mieux que la peau n'est point tendue. Les Ciseaux font alors d'un seul coup, ce que le Bistouri le plus tranchant ne feroit pas sans quatre, et avec beaucoup plus de douleur. Le Bistouri est spécialement recommandé quand on a le projet de réunir les parties qu'on est forcé de retrancher, comme dans le cas de lièvre. *Pott* oublie peut-être dans ce moment cy, que l'objet du Chirurgien est d'acciter la suppuration de toutes les parties qui ont servi d'enveloppe à la tumeur extirpée. Or, il est incontestable que le tranchant des Ciseaux sera préférable au Bistouri, puisque le déchirement dont on l'accuse doit hâter l'obstruction inflammatoire qui précède la suppuration, et en augmente les proportions. Un peu plus de sagacité à *Pott* lui - - - auroit évité des indecences auxquelles nous ne répondrons pas, pour l'honneur de deux grands hommes dont il insulte la mémoire.

à craindre qu'à espérer. Si ce tableau est fidèle, comme je le crois, il est bien fait pour exciter le courage de certains Chirurgiens, qui dans quelques circonstances douteuses n'oseroient point tenter l'opération dans la crainte d'être désavouée par les événements. Le pronostic le plus défavorable ne nous justifie pas toujours, et le Public qui est rarement d'accord avec nos opérations, nous condamne souvent sur nos meilleures raisons. — Qui m'eût dit qu'en lisant attentivement les observations de Lott, on devoit y trouver, quelque part, des traces des accidents les plus ordinaires attachés à l'opération de la castration. une matière aussi intéressante que l'est celle cy sembloit le desirer, et il n'en est rien. Il n'est point inutile, cependant de mettre sous les yeux de praticiens commençans, les événements qui peuvent être une suite des différens procédés opératoires, afin qu'ils se préviennent contre eux, et qu'ils deviennent plus attentifs dans l'observation, et plus circonspect dans l'usage des remèdes qu'on doit leur opposer. je ne l'ai jamais imaginé différemment, et l'amour seul du bien m'a inspiré la nécessité de joindre à ma pratique la relation des événements qui l'ont suivie.

Je m'attendois à être plus éclairé que je le suis sur



la Fétilé que je cherchois; je courrois après la vraie cause des accidents primitifs et secondaires qui suivent immédiatement et médiatement l'opération de la castration, et je me vois forcé de m'en tenir à des rapports personnels qui heureusement justifient le procédé que j'ai suivi d'après la théorie la plus saine; il ne me paroit pas inutile de décrire l'opération avant que de passer plus loin.

Le malade situé commodément, et les ligaments spermiques près de l'anneau, on les mène en dirigeant l'instrument jusqu'à la partie inférieure du Scrotum. Les parties étant découvertes, on sépare le cordon spermatique de toutes ses adhérences, et on tend l'incision le plus haut qu'il est possible, c'est à dire, jusqu'à l'anneau même, afin de donner au cordon une pleine liberté. Les choses étant ainsi, on détruit ensuite toutes les adhérences du Testicule avec le Scrotum, soit avec les doigts, soit avec les ciseaux, ou avec le bistouri, selon que les circonstances le permettent. Le Testicule étant entièrement détaché, on coupe le cordon à un pouce environ au dessous de l'anneau et on en fait la ligature. Cette ligature faite avec précaution, fermeté et solidité, il n'est point inutile de repousser avec douceur le cordon dans l'anneau, et bien loin de le comprimer par un bandage serré, on place de côté les fils de la ligature,

et on presse la plaie avec toute la mollesse imaginable. un
 suspensoir bien adapté soutient l'appareil, tandis qu'une large
 pelotte de charpie, ou de linge doux placée entre les cuisses
 lui sert d'appui. il n'y auroit que le volume excessif de la
 tumeur qui décideroit à retrancher une partie du Scrotum,
 ou son ulcération ou sa callosité. Puisqu'on a l'intention de
 faciliter la rétraction du fardou, il semble qu'il conviendrait
 mieux de rompre toutes les adhérences du testicule avec le Scrotum,
 et du fardou avec le tissu cellulaire qui enveloppe la gaine avant
 de faire la ligature. l'expérience contraire à celle de Lott,
 fait connoître d'après l'observation qu'il est préférable de faire
 l'amputation avant que de faire la ligature, dans tous les
 cas où le fardou est sain dans une certaine étendue. —
 La section faite, le fardou jouit d'abord de sa liberté
 rétractive, et il est plus aisé de convenir ensuite du lieu où
 l'on doit placer la ligature.

Cette ligature se fait avec un ruban composé de quatre
 à cinq brins de fil fort, bien ciré, dans lequel on a passé
 de petites compressees, tout ainsi qu'on le pratique dans la
 ligature des artères après l'amputation des membres. Ces petites
 compressees font un point d'appui sur le calibre des vaisseaux et
 empêchent que le fil ne les rompe, comme je le vu arriver
 plus d'une fois.

On a regardé jusqu'ici avec assez d'indifférence la Situation que devoient tenir les blessés après l'opération. Cette Situation cependant concourt singulièrement à la cure parfaite, quand elle est bien dirigée. la rétraction du fordon étant, selon moi, le point intéressant de la cure la plus douce et la plus prompte, je cherche à la favoriser en plaçant le malade horizontalement, l'extrémité inférieure parfaitement étendue et les jambes un peu écartées. une position contraire m'a fait connaître qu'il en résulteroit des accidens conséquens. Les douleurs que les malades éprouvent après la fistulière faite, lorsqu'ils veulent se redresser en marchant, démontrent la nécessité de la Situation que je propose. La fistulisation du fordon plus ou moins retiré dans l'anneau, son engorgement et sa roideur, sont les causes primitives et essentielles des maux cruels qui succèdent à l'opération. la tension permanente du fordon décide nécessairement des embarras dans les parties du voisinage, et le tiraillement perpétuel des divisions nerveuses et sanguines doit produire des accidens d'autant plus fâcheux qu'il est presque impossible d'y porter remède.

L'Anatomie qui nous démontre la communication du nerf spermatique avec la première, la seconde paire lombaire, et avec la douzième paire dorsale et le grand sympathique,

nous éclaire sur la cause, la nature et l'intensité de la douleur qui est une suite nécessaire de la tension des nerfs spermaticques qui en dépendent et avec lesquels ils se conjuguent, et sur les effets fâcheux qui résultent de cette combinaison. D'un autre côté les artères spermaticques qui naissent de l'aorte descendante et qui ne sont pas moins susceptibles de rétraction que les nerfs spermaticques, par leur structure fibreuse, concourent bien positivement à multiplier les accidents et à les aggraver, en excitant et en augmentant l'engorgement et la tension des vaisseaux collatéraux, qui se distribuent aux parties voisines et avec lesquelles elles se combinent. Tous ces rapports tant immédiats que médiats ne sont-ils pas plus que suffisants pour occasionner des maux insurmontables?

La rétraction plus ou moins prompte et plus ou moins sensible du cordon, dépend beaucoup de l'âge et de la constitution. La flexibilité et la souplesse des fibres est l'appanage de leur constitution individuelle. plus elles seront lâches et faibles, plus par conséquent elles céderont à la force qui tend à les allonger, et cette force employée à leur tension se partagera infailliblement sur toutes celles qui se communiquent, sans gêner pour cela leur action d'une manière bien sensible. Cette propriété de la fibre est l'attribut des ages tendres et des

Tempéramens humides et froids. Une Théorie si Simple et si
 conforme à nos principes nous explique pourquoi la castration
 faite à des jeunes gens qu'on livre aveuglément à l'ignorance
 de certains chirurgiens, n'a presque jamais des suites fâcheuses,
 tandis qu'au contraire elle peut être mortelle dans un âge plus
 avancé, ou chez des sujets d'une constitution toute opposée.
 Je croirois volontiers qu'on ne s'attache pas assez à connoître
 les différentes dispositions de la fibre dans la cure des maladies
 chirurgicales; c'est cependant cette connoissance qui seroit dans
 le cas de diriger sur la plus grande partie des Objets qui
 nous intéressent dans la cure des playes, et le défaut d'attention
 dans la comparaison des différentes constitutions, est une Omission
 qui entraîne constamment dans l'erreur. l'état de la fibre
 peut détourner les accidens, comme il peut les faire naître
 et les entretenir. Une fibre souple sert quelque fois si
 adroitement et si heureusement le charlatanisme qu'on s'est
 vu pour ainsi dire forcé d'applaudir à certains succès dont l'honneur
 passe de plein droit à l'opérateur et accrédite indispensablement
 son talent. Veut être que, si les chirurgiens le plus
 distingués dont on vient d'exposer la doctrine avoient pris
 la peine de faire des justes remarques sur les divers objets
 qui sont dans le cas de remourir au succès de cette opération,

en même tems que certains historiens non moins recommandables ont prononcé sur son exclusion en s'appuyant sur les faits ou elle dégrade l'humanité. peut être, dis-je, l'Art y auroit-il gagné, et les fondemens de l'empirisme se seroient-ils écroulés? la plus part des faits ne prennent de consistance que par la manière avec laquelle on les développe et on les présente, et la base de cette consistance tient aux principes d'après lesquels on les raisonne.

Il a paru inutile d'entrer dans les différentes causes des maladies qui affectent le Testicule. Les nombreux détails sur la division de ces maladies nous auroient jetés dans des répétitions presque inevitables. Nous nous sommes principalement occupés à rechercher les causes des accidens qui suivent l'opération; il s'agit actuellement de justifier par l'observation ce que nous avons cru le plus capable de remplir notre objet.

Obs. I. Le nommé Jean Hultt garçon soldat âgé d'environ 22 ans, d'une constitution sanguine, portoit depuis l'ingt-six mois un engorgement dans le testicule gauche, qui étoit devenu scirrheux. L'accroissement de cette tumeur avoit été rapide, et lorsque cet homme se présenta à l'hôpital le 30 juillet 1775. le Testicule étoit d'un volume considérable. — Cette maladie étoit la suite d'une fluxion sur les bourses,



occasionné par une gonorrhée négligée. M^r. Bengardt mon supérieur, et de qui personne ne pouvoit suspecter l'éloge que je serois dans le cas de faire de Sea Valera, lui avoit administré une suite de remèdes propres à combattre cette maladie, remèdes cependant, auxquels elle résista. Le Testicule étoit dur et douloureux et le fordon étoit engorgé. La seule ressource de l'art étoit la castration à laquelle il se soumit: cette opération fut faite de la manière dont je viens de la décrire, en présence de M^r. M^r. Boeckler et Bengardt. Je ne plaçai la ligature à un pouce au dessous de l'anneau qu'après la destruction complète des adhérences du fordon et après l'amputation du Testicule. quoique je n'eusse pris aucune précaution pour épargner les douleurs de la ligature au malade, il protesta n'en avoir ressenti qu'une très médiocre. un pansement doux, une diète soutenue, des lavemens simples, des flanelles trempées dans une décoction emolliente et appliquées sur le bas ventre, et une situation horizontale furent les moyens préliminaires que j'employai. Le Vola ne fut ébranlé par la fièvre que le troisième jour, encore cette fièvre fut elle aussi légère que de peu de durée. Le premier pansement ne se fit que le quatrième jour, et déjà on avoit peine à voir le fordon, tant il s'étoit retiré. La ligature tomba le

trizième, et le malade sortit de l'hôpital le deux du mois d'août suivant, sans avoir éprouvé aucun accident dans le cours du traitement.

Obs. II. Dans le courant du mois de mars 1776. un officier d'un Régiment Suisse attiré par la confiance qu'il avoit en M^r. Boeckler Ancien Chirurgien en Chef de l'hôpital bourgeois, vint à Strasbourg pour se faire traiter d'un Sarcocèle. Cet Officier étoit dans la 50^{ème} année de son âge, et d'un Tempérament Sec. Depuis trois ans le Testicule gauche étoit tuméfié par la même cause que celle qui a fait le sujet de la maladie rapportée dans l'observation précédente. ... le testicule étoit d'une médiocre grosseur, et depuis quelques mois seulement, il y ressentoit de la douleur. La tumeur étoit dure et sa surface inégale; mais heureusement le scordou étoit sain. Le malade avoit déjà subi plusieurs traitements antivénériens sans aucun succès. M^r. Boeckler m'engagea à suivre cette cure avec lui, et nos avis se réunirent sur l'absolue nécessité d'amputer le Testicule. L'opération fut faite après des préparations convenables, de la même manière que dans le cas précédent. Le malade souffrit très peu et il n'eut d'autre accident qu'un accès de fièvre qui ne se déclara que le quatrième jour, et qu'une seule saignée fit dissiper.



Quoique Mr. Boeckler n'en par rapproché le cordon de l'anneau ainsi que je le pratique, on vit qu'il s'étoit retiré plus de moitié à la levée du premier appareil qui étoit le quatre d'après l'opération; mais le sixième il n'étoit déjà plus visible. Le malade fut complètement guéri dans trente quatre jours.

La rétraction du cordon avoit paru si sensible à Ledran, qu'on a vu que c'étoit son premier motif pour ne pas le lever pour de l'anneau, comme le propose Jarengéot. mais cette rétraction n'avoit pas moins été pour Jarengéot un sujet de méditation. S'il n'est pas d'une absolue nécessité d'inciser l'anneau pour favoriser cette rétraction, dans tous les cas sans distinction, il n'en est pas moins vrai qu'il en est ou il paroît indispensable de le faire. l'engorgement des vaisseaux spermaticques, et les darts apparents exigent nécessairement cette précaution, en voici un exemple.

Obs. III. Un garçon perroquiné âgé de vingt six ans, d'une constitution un peu délicate, entra à l'hôpital bourgeois de Strasbourg le 10. Octobre 1776. affecté depuis six ans d'un Sarcocèle du Testicule droit, maladie qui étoit la suite d'une chute de cheval. peut-être ne seroit-il pas décidé

à demander des secours, si cette tumeur ne se fut pas enflammée et si, d'indolente qu'elle étoit, elle ne fut devenue excessivement douloureuse.

Le rapport du malade ne laissoit aucun doute sur la fausseté de son indisposition. On le prépara à l'opération. La forme de cette tumeur annonçoit une simplification, et rien n'étoit plus vrai. plus de six onces d'un mélange d'eau et de pus qui sortirent à l'ouverture des membranes, confirmèrent mon diagnostic. Le testicule et l'épididyme étoient durs et ulcérés en différens endroits. Le fordon quoique très gros étoit mol. Je pensai qu'il me seroit plus commode de séparer d'abord le testicule que de commencer par le fordon. parvenu à la hauteur de ce dernier, je le détachai avec attention jusqu'à l'anneau même que j'insérai, dans la crainte que l'engorgement inflammatoire ne l'exposât à être comprimé, afin de pouvoir porter la ligature dans le lieu le plus convenable. Le malade fut tranquille après l'opération et il n'y eut rien de d'extraordinaire pendant le jour, si une gaucherie, qu'il avoua avoir mangé la veille, ne lui eut occasionné des douleurs de coliques, que quelques évacuations et des saignées sollicitées par des lavemens, apaisèrent. — l'appareil fut levé le quatre, et jusqu'à là, le malade n'avoit



point encore eu de fièvre : elle ne paraît que le soir au soir et fut très légère. Au premier pansement le fordon étoit presque entièrement hors de la vue, et la suppuration bien établie le sixième de l'opération, annonça un état de bien qui ne fut point interrompu jusqu'au quarante cinquième jour qu'il sortit de l'hôpital, parfaitement guéri.

Les Variétés dont les mêmes maladies sont susceptibles, font varier les moyens curatifs. L'incision de l'anneau étoit indispensable dans ce cas cy, relativement à l'état du fordon; le Suiva qui a suivi cette incision ne la fera certainement pas suspecter, on conviendra donc qu'elle n'est pas généralement inutile.

Obs. IV. En 1778. le 5 mai, j'opérai d'un sarcoïte, le nommé Michel Long garçon boucher âgé de 32 ans d'un Empoisonnement Sanguin qui depuis près de onze ans avoit le Testicule droit engorgé à la suite d'un écoulement vénérien répété. Six mois après cet accident il sentit la nécessité de subir un traitement complet qui n'eut aucune influence sur le testicule malade. La tumeur jusqu'à là n'avoit point augmenté de volume; mais en se durcissant, elle étoit devenue douloureuse. les douleurs s'accrurent et distendirent le testicule grossit de plus en plus, et fut incisé. Le fordon étoit un peu souffrant quoiqu'

assez mal cependant pour entreprendre l'opération avec l'espoir du succès. il fut opéré après vingt un jours de préparation. le testicule, et le cordon principalement, étant détaché dans toute sa circonférence et jusqu'à l'anneau même, je plaçai la ligature à la distance d'environ un pouce de l'anneau. Le malade est le seul qui se soit plaint d'une sensation douloureuse dans les fesses, tandis que je serrois la ligature. Le cordon étoit déjà raccourci de plus de moitié le 3^e jour de l'opération qu'on leva l'appareil pour la première fois, et le dixième on ne le voyoit plus. Le malade n'eut pas le moindre accident dans le cours de son traitement; il reprit ses occupations ordinaires six semaines après, sans la plus légère inquiétude.

Dentre les hystoriens qui sont entrés dans quelques détails sur la castration, quelqu'un ont confondu les effets avec les causes, dans le compte qu'ils ont rendu des accidents, et c'est ce qui est arrivé à Mr. Ravaton¹⁸⁾ sa méthode d'opérer tient beaucoup à celle de Ledran, et sa manière de lier le cordon à celle de Paul d'Aegine. Il passe son fil au milieu du cordon, et sans chercher à

18) Pratique de Chirurgie moderne. T. 2. pag. 522. §. 5.



S'assurer de quel côté est l'artère, il serre la ligature ou il présume qu'elle est. mais ces présomptions ne sont pas admissibles, il faut des certitudes. Car si l'hémorrhagie à lieu indépendamment de cette première ligature, M^r. Ravaton se voit dans le cas de faire la seconde. À quoi bon prolonger l'opération si inutilement, ou est donc l'avantage que M^r. Ravaton prétend tirer d'une pratique aussi singulière que mal entendue ?

On sera surpris que ce chirurgien qui ne prend aucune précaution pour prévenir les accidens, s'étende même avec prolixité sur les moyens de les combattre. S'il s'étoit occupé de l'état du fardon et qu'il eut connu la nécessité de le séparer de l'anneau, il auroit infailliblement rencontré la cause originelle des mouvemens convulsifs qui décide quelque fois la ligature, et alors il lui auroit paru aussi aisé qu'à un autre de les éviter. S'il y a des raisons pour expliquer pourquoi ces accidens arrivent, il doit y en avoir aussi pour expliquer, pourquoi ils n'arrivent pas. Les suppurations de la partie supérieure du fardon quelque abondantes qu'on les suppose avec M^r. Ravaton ne seront point dans le cas de faire courir aux malades les dangers les plus pressans. Les accidens ne dépendent

essentiellement que de l'état d'engorgement inflammatoire du
fordon, aussi es-ce le second ou le troisième et même le
quatrième jour après l'opération; qu'ils paroissent.

La suppuration loin d'être un mal est un bien réel puisqu'elle dissipe cet engorgement. telle Doctrine si naturelle et si connue n'a pas frappé d'abord M^r Ravaton, mais peu à peu il s'est laissé persuader. *vid. pag. 524.*

On n'a jamais douté un moment que la ligature du fordon spermatique puisse donner lieu à des accidens graves, on pourra s'y attendre toutes les fois, qu'elle aura été faite sans précaution, à moins que les fibres ne soient assez flexibles, ainsi que je l'ai dit, pour pouvoir se replier sur elles même indépendamment des adhérences qui les enveloppent.

Monsieur Lombard avoit fait la castration à un homme d'une constitution bilieuse et sèche, qui étoit dans sa cinquantième année, environ, le malade souffrit beaucoup trois heures après l'opération, ce qui détermina M^r Lombard à lever l'appareil. il avoit fait la ligature du fordon un pouce au dessous de l'anneau sans l'en avoir totalement dégagé. quoique ce fordon fût déjà tuméfié, le Chirurgien ne jugea pas à propos de supprimer la ligature, il chercha à le détacher aussi profondément qu'il put, et d'y insinuer



l'anneau, et il y réussit: les douleurs s'appaisèrent insensiblement, et rien ne troubla plus la cure, qui fut assez prompte.

Quelques observations ajoutées à celle cy seroient infailliblement senties l'importance de détacher le fordon de toutes ses adhérences en pratiquant l'opération. M. Lombard a saisi le point de la difficulté, la tuméfaction du fordon lui a fait connoître la nécessité qu'il y avoit de lui donner la liberté de se retirer, et la dissipation de la douleur a justifié son pronostic. l'application des relâchans dont il fit usage citôt après l'opération, n'auroit été qu'un faible secours contre les événemens futurs. Le succès de ce Chirurgien confirme notre Doctrine; c'est pourquoi on conviendra qu'il est plus naturel de recourir à la cause qu'aux effets pour faire cesser les accidens quand ils commencent à naître.

M. Ravaton nous présente encore matière à réflexion. il est d'avis* que dans la cas précédente on ne coupe la ligature qu'autant qu'on n'aura point emporté les testicules le jour de l'opération, et c'est exactement ce qu'il fait lorsque le fordon est bien gonflé. Cette manière de faire que M. Ravaton ne compare point à celles qui lui sont préférables, a des vices apparents. il seroit utile de savoir.

* pag. 526. Vol. cit.

Si quand le cordon est tuméfié sans dureté bien sensible, on ne doit pas amputer le testicule d'abord dans l'espoir que cette tuméfaction diminuera; tandis qu'au contraire il est prouvé qu'elle doit augmenter. Je me plais à répéter qu'une ligature bien faite et convenablement serrée tient à l'abri des craintes qu'on pourroit avoir sur l'hémorrhagie, et que ce motif ne doit pas en être un pour laisser le testicule. il est permis de douter de l'avantage qu'on pourroit retirer de ce précepte ainsi que de l'heureux effet d'un emplâtre d'onguent de la mère étendu assez épais sur du linge, duquel M^r Ravaton s'est servi par préférence aux fomentations émollientes, dans la vue d'entretenir la souplesse et le relâchement des ligumens du bas Ventre du S^r Henry Fayon qu'il avoit castré.*

Il est surprenant combien la pratique chirurgicale varie, surtout quand elle n'est point étayée des principes primitifs et essentiels. Cette surprise se fait sentir dans les choses de la moindre importance. Les nouvelles routes que certains Chirurgiens ont cru devoir se frayer dans l'art de guérir, les ont conduit à l'égarement, et M^r Ravaton est de ce nombre. il a imaginé un secre ligature pour comprimer le cordon pour

* Vol. d. pag. 525.



gradation, qu'il juge bien au dessus de la manière de faire la ligature à l'ordinaire: mais comprimer le cordon par degré c'est recueillir l'irritation des fibres, entretenir la douleur et l'étendre insensiblement dans toutes les parties où répondent les fibres à demi étranglées: la comparaison des muscles et des nerfs à demi coupés qui donnent occasion l'un et l'autre à plusieurs accidens de conséquence qu'on ne peut faire totalement cesser qu'en coupant entièrement les mêmes fibres, pouvoit elle ne pas se présenter à l'idée de M. Ravaton. Si on vouloit chercher la cause qui a jeté l'aide major de Landau dans un si pitoyable état, seroit-il possible de la trouver ailleurs que dans la singularité du procédé que ce chirurgien a employé pour se rendre maître du sang, et pouvoir retrancher avec plus d'assurance le Testicule. C'est sous une pression médiocre qu'il survint une hémorrhagie, des sueurs froides, des convulsions, et que la nuit fut si orageuse. Cet intrépide chirurgien ne s'en tint pas là; il plaça quelques jours après deux ligatures à des distances convenables et une seconde pression quoique médiocre encore, rappela une partie des premiers accidens. Le genre nerveux agacé, causa des contorsions involontaires et continuelles dans les deux extrémités. la respiration fut pénible et courte, le globe de l'œil étoit enfoncé dans l'orbite et la vue étoit entièrement dépravée.

Henry Cayenne, marchand à Bethem ne fut guère plus heureux que l'aide major de Landau. il ne perdit que trois onces de sang dans la manœuvre du Serre ligature; la journée fut inquiétante, le pouls s'éleva sur le soir, et le malade eut des frissons quoiqu'il eut lâché son instrument de trois francs. Si les douleurs se dissipèrent dans la matinée malgré que la nuit eut été sans sommeil, cela pouvoit-il annoncer autre chose que ce que M^r. Ravaton trouva le lendemain; je veux dire, la masse charnue plus tendue, son volume augmenté, et pour le dire en un mot, des parties menacées de gangrène à laquelle cette masse n'échapa pas dans la suite.

Les nombreuses réflexions qu'on seroit dans le cas de faire sur la méthode opératoire de ce Chirurgien induiroit à une prolixité qui ne seroit rien moins qu'instructive pour les gens de l'art. Il seroit mieux de dire. Selon moi que les deux malades dont M^r. Ravaton donne l'histoire, ont augmenté le martyrologe, en servant d'holocrauste à la précieuse découverte de l'instrument Serre ligature, quoique guidé par une sublimité de génie dont rien n'approche; --- reprenons notre objet.

On a vu que ces différentes constitutions, et la variété des âges avoient déjà levé un coin du rideau qui couvroit



certains mystères relatifs aux accidens et à la fièvre de l'amputation du testicule; il ne sera pas inutile sans doute de comparer actuellement les parties saines qu'on retranche sous des motifs aussi ridicules que bizarres, avec l'état de maladie de ces mêmes parties qui doivent être amputées pour une fièvre radicale. Ne sauroit-on prouver à la faveur de cette comparaison que les accidens de l'opération sont en très grande partie attachés à l'état du fordon et à la disposition naturelle qu'il a de se contracter après la Section? Il est constant que toutes les fois qu'on amputera les testicules sains, comme le font encore aujourd'hui certains hystrions dans l'intention de guerir radicalement la hernie, chez les enfans surtout; bien convaincu que l'on est que cette opération n'exclut pas la maladie, mais qu'elle la métamorphose, il est constant, dis-je, qu'on aura point à combattre les mêmes accidens qui sont une suite ordinaire de l'amputation des testicules malades; j'en appelle à l'observation. D'où dépend donc cette différence si sensible, si ce n'est de l'état du fordon? quand le fordon est sain, il jouit invariablement de la propriété de se retirer, et la facilité plus ou moins grande avec laquelle il le fait, décide toujours de la fièvre qui doit être moins traversée et par conséquent plus prompte. —

Si les fibres constituantes des vaisseaux qui composent le

fordon sont roides, désunies et pour ainsi dire rasornies —
 par l'âge ou par la maladie, la cure est toujours laborieuse
 et incertaine. La Chirurgie comparée vient à l'appui de ce
 raisonnement. On sait qu'il est un âge pour faire avec
 succès la castration à certains animaux domestiques, tel
 que le Cheval et le Bœuf, parmi lequel un animal
 court les plus grands risques. L'expérience a tellement
 appris à se défier de cette opération que les experts en l'art
 ne la tentent jamais alors; ou c'est toujours contre leur
 gré: par la certitude morale. ou ils sont que l'animal
 périra.

Ce motif n'est peut-être pas le seul qui écarte cette opération,
 mais il est au moins présumable qu'il y en a pour quelque
 chose d'après l'observation. Il seroit possible de trouver
 la résolution d'une partie du problème que nous venons
 de proposer en analysant la question qui consiste à savoir
 pourquoi le testicule et le fordon étant sains, l'opération
 n'est susceptible d'aucun accident grave. en admettant pour
 preuve plusieurs histoires de gens qui se sont eux mêmes
 retranchés les organes de la Virilité, ou à qui on les a
 retranchés dans des vûes contre lesquelles l'humanité ne cesse
 par de réclamer, gens cependant qui guerissent sans la moindre
 inquiétude. —

Des inductions si naturelles nous ramènent directement
 à notre point de discussion ; C'est précisément là, où nous
 pouvons demander si la méthode proposée et employée avec
 succès par de très grands maîtres seroit adoptive dans
 tous les cas. Surtout que la ligature du fordon étoit
 la cause primitive de tous les symptômes graves qui
 décidoient la perte des opérés pour cause de maladie,
 on a imaginé qu'on pouvoit substituer à la ligature,
 la compression du fordon spermatique sur le Vésic.
 Cette compression a été faite plusieurs fois avec succès par
 M. Louis.* Il m'est bien agréable ici, de rendre à un
 des plus grands Chirurgiens des nations connues, l'hommage
 dû à la supériorité de ses Talens : mais si dans l'usage
 que nous devons faire de nos observations, en les dirigeant
 du côté de la perfection de l'art, il est permis de comparer
 la suite, ou me permettra sûrement de demander, si dans
 les différents cas où M. Louis a employé la compression,
 le fordon spermatique étoit sain ou malade ? si qui me
 faisoit croire volontiers que cette compression ne peut pas
 être généralement aduise, c'est l'histoire de deux cas
 qui me sont particuliers, où cette compression loin d'avoir

* journal de Médecine de l'Année 1758. T. 9. pag. 526.

en un succès heureux, & d'être préjudiciable.

En 1770. Mons. Böeckler fit l'amputation d'un
 Testicule du poids de plus de deux livres à M. L. employé
 aux batimens de la Ville de Strasbourg en présence de M.
 M^{rs} Lobstein, Professeur en l'université de médecine de cette
 ville, et Chauveau, Chirurgien major du Regiment de
 Deuxponts, et de moi. Le malade étoit d'un très bon
 Tempérament et l'accident qui avoit donné lieu à sa maladie
 n'étoit pas de nature à pouvoir altérer directement sa santé.
 quoique le fordon fut en bon état, le Testicule étoit douloureux,
 et il y éprouvoit par fois des douleurs lancinantes. Après
 de préparations suffisantes, M. Böeckler l'opéra.
 Le bon état du fordon l'engagea à le comprimer sur le Testicule
 au lieu d'en faire la ligature; peu d'heures après l'opération.
 le malade ressentit une douleur vive dans l'anneau, douleur qu'il
 exprimoit comme si elle eut été causée par un tiraillement qui
 repoussoit aux reins. La fièvre survint presque aussitôt; le bas
 ventre devint douloureux, et les accidents augmentèrent malgré
 les saignées répétées, les lavemens, les fomentations émollientes
 et les boissons adoucissantes et nitreuses. quelques heures après
 il eut des nausées très fréquentes qui précéderent un vomissement
 qui excita une hémorrhagie par le fordon. l'absence de M.



Boëckler me donnoit des droits sur le malade : je levai l'appareil, et je replaçai le cordon spermatique. L'hémorrhagie arrêtée, ma tâche fut remplie. La nuit suivante fut une nuit d'inquiétude et de douleur. Le lendemain au matin le malade eut de mouvemens convulsifs dans les muscles de la face, la bouche étoit béante, et la mâchoire inférieure un peu déjetée à gauche, ne pouvoit pas se rapprocher de la supérieure. Les bains et les saignées du pied ne produisirent aucun calme. le malade mourut dans le Tétanos, le soir du troisième jour après l'opération.

Cette observation prouve, si je ne me trompe, que les accidens que le malade a éprouvés n'ont dépendus essentiellement que de l'impossibilité de la rétraction du cordon. L'histoire suivante est une assertion de plus pour les principes sur lesquels nous établissons notre doctrine.

Le nommé Fromel Fertheimer, natif d'Oberodrot en Alsace, de nation juive, âgé de 18 ans, d'une constitution sanguine, portoit depuis quatre ans un Sarcocèle dont il avoit l'air d'ignorer la cause. Cette tumeur étoit d'un volume extraordinaire. Les douleurs qu'il y éprouvoit étoient excessives et l'état de la tumeur prête à s'ouvrir firent souscrire le malade à l'opération qu'on lui proposa. Quoique le cordon fut engorgé, il étoit

Souple, et ce fut par rapport à cet engorgement qu'on convint de n'en point faire la ligature. Le testicule ainsi que le cordon entièrement détachés de toutes leurs adhérences, je plaçai celui-ci sur l'os pubis et le soutins par quelques tours de bande. quatre heures environ après l'opération, les douleurs vives que ressentit le malade nous rappêlerent près de lui, M^r. Boeckler et moi. il se plaignoit d'un déchirement d'entrailles. les yeux étoient égarés, la peau brûlante et l'artere serrée et tendue. Instruit à ne l'oublier jamais par l'événement du malade qui fait le sujet de l'observation précédente; je proposai de lever l'appareil, de détacher le cordon jusqu'à l'anneau et de le livrer à son extrémité. M^{rs}. M^{rs}. Boeckler et Riesel consultants ne s'y opposerent pas. deux heures après cette seconde opération les symptômes diminuerent sensiblement, et le lendemain au matin on nous informa que le malade étoit dans la meilleure position. le quatrième jour on leva l'appareil et nous vîmes avec surprise, M^{rs}. M^{rs}. les consultants et moi, que le cordon étoit presque entièrement retiré. La ligature tomba le quatorzième jour et le malade fut entièrement guéri le quarantième. L'activité et la violence de ces symptômes ne laissent guère de doute sur leurs causes. Les deux malades avoient été saignés une heure après l'opération, et quand même

La cure fut prompte, et tant que le malade resta couché il n'éprouva rien d'inquietant. Il n'en fut pas de même lorsqu'il fut debout, il se plaignit bientôt d'une douleur dans l'aîne qui se portoit jusqu'au rein, et il ne pouvoit ni se redresser ni marcher. Les douleurs devinrent de plus en plus vives allumèrent la fièvre. Les saignées, les bains, les fomentations, les lavemens émolliens, &c. furent sans succès, et le malade perit le quatrième jour dans des convulsions affreuses; la plaie étant totalement cicatrisée depuis huit.

Mons. Boeckler qui m'a communiqué cette observation, fait l'aveu de n'avoir point dégagé le cordon de l'anneau, et il ne doute point que cette omission n'eût été la cause de la mort de ce Religieux; mais il y a lieu de croire que la situation négligée y a coopéré. Ce malheur n'est pas le seul dont cet ancien praticien a été Témoin dans sa pratique. Il fit l'opération d'un gros Sarcocèle le 15 mars 1751. à un Cordonnier de Strasbourg âgé de 45 ans et d'une Constitution délicate. Le Sarcocèle avoit été dévidé par une gonorrhée supprimée qu'on avoit en vain essayé de résoudre par les frictions mercurielles locales. Quoique le Testicule fût gros et douloureux, le cordon étoit à peu près sain. La ligature fut faite à la manière ordinaire et le malade n'eut aucun accident.



ou se seroit déidé à répéter les saignées, auroit-on pu espérer de vaincre un accident ? On ne le présume pas.

Il résulte de ces Observations que si la compression du fordon sur le Tubie peut être un moyen d'arrêter l'hémorrhagie, elle peut être aussi la source de plusieurs accidents, contre lesquels je suis bien disposé à croire qu'on ne peut se mettre à l'abri qu'en dépouillant entièrement le fordon de toutes ses adhérences.

Il suit de ces réflexions que la compression du fordon sur le Tubie ne peut être employée, que dans le cas où le même fordon seroit bien sain, que ses fibres seroit parfaitement souples, et qu'enfin le Sujet seroit jeune et plus affoibli que vigoureux.

De cette question de fait nous passons à une autre, et essayons de démontrer par l'observation que les accidents qui surviennent après l'entière sucrisation de la plaie dépendent principalement de l'adhérence du fordon à l'anneau et de sa tension.

Un religieux de l'ordre de St. Benoit, âgé de cinquante ans, d'un tempérament sanguin, fut opéré le 6 février 1746 d'un Sarcocèle assez considérable qu'il portoit depuis plusieurs années, à la suite d'un coup reçu sur les bourses. on n'avoit point pris en opérant la précaution de dégager le fordon de l'anneau. La ligature fut placée un pouce au dessous. on abandonna le malade à une situation volontaire. —

la plaie fut cicatrisée le 35 jour, il essaya de marcher le 36.^e — et d'abord il éprouva une douleur aiguë dans l'aîne, du côté opéré. Cette douleur ne cessa point comme dans le cas précédent, à aucun des moyens qu'on se devoit employer, et après vingt quatre heures d'une fièvre très vive, le malade mourut dans le Tétanos.

On lit aussi dans *Theden* 19. qu'un Vieillard de distinction qui portoit depuis nombre d'années un Sarcocèle d'un volume considérable, se décida à le faire amputer, parcequ'il commençoit à devenir douloureux. Il fut opéré par une main habile, et la plaie se cicatrisa très vite. mais quelques Jours après cette guérison, il fut attaqué d'une Epilepsie à laquelle il succomba.

Theden en fit l'ouverture et reconnut que la cause de cette maladie dépendoit de ce que le Sordon Spermatique étoit attaché hors de l'aîneau, par une souduroie étroitement serrée qui tenoit le Sordon dans une tension continuelle. Le Chirurgien assura, que s'il eut survécu encore quelque Jours, il avoit le projet de lui proposer une Seconde opération par laquelle il auroit détruit les adhérences du Sordon, qu'il auroit ensuite repoussé dans l'aîneau. Je veux bien croire que *Theden* auroit put réussir; mais il falloit être assuré que la maladie dépendoit absolument de cette adhérence, et *Theden* ne désigne rien dans la naissance des accidens qui ait pu donner une

idée qu'ils dépendoient de cette adhérence.

Les observations viennent à l'appui des motifs qui nous ont engagé à conseiller la séparation du fordon spermatique, de l'auneau. Cette espèce de Dissection n'avoit eu lieu dans l'une ni dans l'autre de ces opérations, non plus que la Situation horizontale des opérés, Situation dont nous avons fait sentir la nécessité. Les omissions sur les deux principaux objets les plus intéressans de la cure, partagent entre elles les mêmes fautes de ces trois opérations.

Est en usant de ces précautions qu'Acrel²⁰ se félicite d'avoir eu un succès constant dans l'opération de la castration. Sur le grand nombre de malades qu'il a opérés, il n'en a perdu qu'un seul, vingt quatre heures après l'opération; encore l'ouverture du cadavre fit elle voir que la cause de la mort n'étoit point déterminée par les suites de l'opération; car on trouva les Viscères ulcérés, les glandes méseraïques obstruées et plusieurs ulcères cancéreux sur la surface de l'intestin jejunum.

Après avoir comparé les différens procédés opératoires entre eux, et après les avoir balancés avec l'observation, j'ai imaginé m'appercevoir que le point essentiel de la cure consistoit dans la nécessité de donner au fordon spermatique la liberté



entière de se retirer. La destruction de toutes les adhérences qui enveloppent le fœtus principalement dans l'anneau, m'a suggéré l'importance qu'il y avoit de les détruire autant qu'il étoit possible dans toute leur étendue, et même de dilater l'anneau dans certains cas, sans avoir égard à la réputation de ceux qui ont paru s'opposer à la pratique de *Garengesot*. La situation ne m'a parue moins propre à secourir les vices curatifs, et je me suis toujours fait une loi de la faire observer même avec rigueur.

J'aurois à me glorifier si mes réflexions pouvoient jamais être utiles à l'Humanité, si en sondant les préceptes de l'art; elles pouvoient diriger sur moi la vue de mes juges et me concilier leurs suffrages.

Strasbourg le 24 Jbr 1782.

Marchal Chirurgien,
en Chef de l'Hopital general
des Bourgeois.

